

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Совета  
Евразийской экономической комиссии

от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в технический регламент Таможенного союза  
«О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011)**

1. В приложении 1 к указанному техническому регламенту:

а) позицию 1669 изложить в следующей редакции:

« 1669	Перемещенно или удалено	Moved or deleted	»
--------	-------------------------	------------------	---

б) дополнить позициями 1681 – 1694 следующего содержания:

« 1681	Тетрафторэтилен	Tetrafluoroethylene	116-14-3	204-126-9
1682	6,6'-ди-трет-бутил-2,2'-метиленди-п-крезол; [DBMC]	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol; [DBMC]	119-47-1	204-327-1
1683	(5-хлор-2-метокси-4-метил-3-пиридил)(4,5,6-триметокси-о-толил)метанон; пириофенон	(5-chloro-2-methoxy-4-methyl-3-pyridyl)(4,5,6-trimethoxy-o-tolyl)methanone; pyriofenone	688046-61-9	692-456-8
1684	(RS)-1-{1-этил-4-[4-метил-3-(2-метоксиэтокси)-о-толуоил]пиразол-5-илокси}этилметилкарбонат; толпиралат	(RS)-1-{1-ethyl-4-[4-mesyl-3-(2-methoxyethoxy)-o-toluoyl]pyrazol-5-yloxy}ethyl methyl carbonate; tolpyralate	1101132-67-5	701-225-3

1685	Азамети́фос (ИСО); S-[6-хлор-2-оксооксазолo[4,5-b]пиридин-3(2H)-ил)метил]O, O-диметилтиофосфат	Азаметифос (ISO); S-[6-chloro-2-oxooxazolol[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O, O-dimethyl thiophosphate	35575-96-3	252-626-0
1686	3-метилпиразол	3-methylpyrazole	1453-58-3	215-925-7
1687	N-метокси-N-[1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]-3-(дифторметил)-1-метилпиразол-4-карбоксамид; пидифлуметофен	N-methoxy-N-[1-methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)-ethyl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide; pydiflumetofen	1228284-64-7	817-852-1
1688	N-{2-[1,1'-би(циклопропил)-2-ил]фенил}-3-(дифторметил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид; седаксан	N-{2-[1,1'-bi(cyclopropyl)]-2-yl]phenyl}-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide; sedaxane	874967-67-6	688-331-2
1689	4-метилпентан-2-он; изобутилметилкетон (MIBK)	4-methylpentan-2-one; isobutyl methyl ketone (MIBK)	108-10-1	203-550-1
1690	Диметоморф (ИСО); (E,Z)-4-(3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил)морфолин	Dimethomorph (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine	110488-70-5	404-200-2
1691	Имазамокс (ИСО); (RS)-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-5-метоксиметилникотиновая кислота	Imazamox (ISO); (RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methoxymethylnicotinic acid	114311-32-9	601-305-7
1692	Тиаметоксам (ИСО); 3-(2-хлортиазол-5-илметил)-5-метил[1,3,5]оксадиазинан-4-илиден-N-нитроамин	Thiamethoxam (ISO); 3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine	153719-23-4	428-650-4
1693	Триконазол (ИСО); (RS)-(E)-5-(4-хлорбензилиден)-2,2-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-метил)циклопентанол	Triticonazole (ISO); (RS)-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-methyl)cyclopentanol	138182-18-0	-
1694	Десмедифам (ИСО); этил 3-фенилкарбамоилоксифенилкарбамат	Desmedipham (ISO); ethyl 3-phenylcarbamoyloxyphenylcarbamate	13684-56-5	237-198-5' »

2. В приложении 2 к указанному техническому регламенту:

а) позиции 26-43, 47, 56 изложить в следующей редакции:

26	Монофторфосфат аммония (Ammonium monofluorophosphate)	Монофторфосфат аммония (Ammonium monofluorophosphate) CAS № 20859-38-5/66115-19-3	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		(а) Содержит монофторфосфат аммония Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: «Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых». В случае потребления фтора из других источников, обратитесь
----	---	---	------------------------------	--	--	---

				<p>(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора.</p> <p>В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном положении, общая концентрация фтора не должна</p>		<p>к стоматологу или врачу".</p> <p>Для средств гигиены полости рта жидких: «Не применять для детей в возрасте до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены полости рта жидкие не замаркированы как противопоказанные для детей (например, «только для взрослых»).</p> <p>(b) Содержит монофторфосфат аммония.</p> <p>Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида.</p> <p>Должны быть указаны рекомендации по применению.</p>
--	--	--	--	---	--	---

27	<p>Динатрий фторфосфат (Disodium fluorophosphate)</p>	<p>Монофторфосфат натрия (Sodium monofluorophosphate) CAS № 10163-15-2/ 7631-97-2, EC № 233-433-0/ 231-552-2</p>	<p>Средства гигиены полости рта</p>	<p>(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.</p>		<p>Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.</p>
						<p>(а) Содержит монофторфосфат натрия. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: «Дети 6 лет и младше: количество</p>

						<p>используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых».</p> <p>В случае потребления фтора из других источников, обратиться к стоматологу или врачу " .</p> <p>Для средств гигиены полости рта жидких: «Не применять для детей в возрасте до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены полости рта жидкие не замаркированы как прогнатовоказанные для детей (например, «только для взрослых»).</p> <p>(b) Содержит монофторфосфат натрия</p> <p>Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5</p>
				<p>(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу</p>		

				<p>фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.</p>		<p>процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида.</p> <p>Должны быть указаны рекомендации по применению.</p> <p>Не предназначена для системного применения.</p> <p>Не рекомендуется потребление фтора из других источников.</p> <p>Не применять для лиц моложе 16 лет.</p> <p>Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.</p>
28	<p>Дикалий фторфосфат (Dipotassium fluorophosphate)</p>	<p>Монофторфосфат калия (Potassium monofluorophosphate) CAS № 14104-28-0, ЕС № 237-957-0</p>	<p>Средства гигиены полости рта</p>	<p>(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация</p>		<p>(а) Содержит монофторфосфат калия.</p> <p>Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например,</p>

				<p>фтора не должна превышать 0,15 процента.</p>		<p>"только для взрослых")          следующая маркировка обязательна:          «Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых».          В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу".          Для средств гигиены полости рта жидких:          «Не применять для детей в возрасте до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены полости рта жидкие не замаркированы как противопоказанные для детей (например, «только для взрослых»).</p>
--	--	--	--	---	--	--

29	Кальций фторфосфат (Calcium fluorophosphate)	Монофторфосфат кальция (Calcium monofluoro- phosphate) CAS № 7789-74-4, ЕС № 232-187-1	Средства гигиены полости рта	(a) 0,15 про- цента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими	(b) В концен- трации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном при- ложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента	(b) Содержит монофторфосфат калия Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.	(a) Содержит монофторфосфат кальция Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до
----	---	---	------------------------------------	--	--	---	--

				<p>соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.</p>		<p>0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна:</p> <p>«Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых».</p> <p>В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ».</p> <p>Для средств гигиены полости рта жидких: «Не применять для детей в возрасте до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены</p>
--	--	--	--	--	--	--



(Calcium fluoride)	(Calcium fluoride) CAS № 7789-75-5, ЕС № 232-188-7	гигиены полости рта	в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсоединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		<p><b>фтористый кальций</b></p> <p>Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна:</p> <p>«Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых».</p> <p>В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу " .</p> <p>Для средств гигиены полости рта жидких: «Не применять для детей в возрасте</p>
--------------------	--	---------------------	--	--	--

						<p>до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены полости рта жидкие не замаркированы как противопоказанные для детей (например, «только для взрослых»).</p>
				<p>(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора в пересчете на молярную массу фтора не должна превышать 0,5 процента</p>		<p>(b) Содержит фтористый кальций Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет.</p>

31	Фтористый натрий (Sodium fluoride)	Фтористый натрий (Sodium fluoride) CAS № 7681-49-4, ЕС № 231-667-8	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор- содержащими соединениями, разрешенными в данном при- ложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	(а) Содержит фтористый натрий Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процентов в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, «только для взрослых») следующая маркировка обязательна: «Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых». В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ".	Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
----	---------------------------------------	---	------------------------------------	---	--	---

					<p>Для средств гигиены полости рта жидких: «Не применять для детей в возрасте до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены полости рта жидкие не замаркированы как противопоказанные для детей (например, «только для взрослых»).</p>
				<p>(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора в пересчете на молярную массу фтора не должна превышать 0,5 процента</p>	<p>(b) Содержит фтористый натрий</p> <p>Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида.</p> <p>Должны быть указаны рекомендации по применению.</p> <p>Не предназначена для системного применения.</p> <p>Не рекомендуется потребление фтора из</p>

						<p>других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.</p>
32	Фтористый калий (Potassium fluoride)	Фтористый калий (Potassium fluoride) CAS № 7789-23-3, ЕС № 232-151-5	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрыхлителями в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	(а) 0,15 процента фтористый калий Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процентов в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: «Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых».	В случае потребления

					<p>фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу".</p> <p>Для средств гигиены полости рта жидких: «Не применять для детей в возрасте до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены полости рта жидкие не замаркированы как прогнитопоказанные для детей (например, «только для взрослых»).</p>
	<p>(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна</p>				<p>(b) Содержит фтористый калий.</p> <p>Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида.</p> <p>Должны быть указаны рекомендации по применению.</p>

33	Фтористый аммоний (Ammonium fluoride)	Фтористый аммоний (Ammonium fluoride) CAS № 12125-01-8, EC № 235-185-9	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор- соединениями, разрешенными в данном при- ложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	превышать 0,5 процента.	<p>Не предназначена для системного применения.</p> <p>Не рекомендуется потребление фтора из других источников.</p> <p>Не применять для лиц моложе 16 лет.</p> <p>Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.</p>
				(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		<p>(а) Содержит фтористый аммоний.</p> <p>Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, «только для взрослых») следующая маркировка обязательна:</p> <p>«Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для</p>

					<p>минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых».</p> <p>В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу " .</p> <p>Для средств гигиены полости рта жидких: «Не применять для детей в возрасте до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены полости рта жидкие не замаркированы как противопоказанные для детей (например, «только для взрослых»).</p>
	(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями,				<p>(b) Содержит фтористый аммоний.</p> <p>Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена</p>

				<p>разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.</p>		<p>информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.</p>
34	Фтористый алюминий (Aluminium fluoride)	Фтористый алюминий (Aluminium fluoride) CAS №7784-18-1, EC № 232-051-1	Средства гигиены полости рта	<p>(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.</p>		<p>(а) Содержит фтористый алюминий Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, «только для взрослых») следующая маркировка</p>

						<p>обязательна:</p> <p>«Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых».</p> <p>В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу».</p> <p>Для средств гигиены полости рта жидких:</p> <p>«Не применять для детей в возрасте до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены полости рта жидкие не замаркированы как противопоказанные для детей (например, «только для взрослых»).</p> <p>(b) Содержит фтористый алюминий.</p>
				<p>(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в</p>		

35	Дифтористое олово (Tin difluoride)	Фтористое олово (Stannous fluoride) CAS № 7783-47-3, ЕС № 231-999-3	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном при- ложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном при- ложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	<p>Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида.</p> <p>Должны быть указаны рекомендации по применению.</p> <p>Не предназначена для системного применения.</p> <p>Не рекомендуется потребление фтора из других источников.</p> <p>Не применять для лиц моложе 16 лет.</p> <p>Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.</p>
	(а) Содержит фтористое олово			(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном при- ложении, общая		<p>Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она</p>

				<p>концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.</p>	<p>не замаркирована как противопоказанная для детей (например, «только для взрослых») следующая маркировка обязательна:</p> <p>«Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых».</p> <p>В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу».</p> <p>Для средств гигиены полости рта жидких: «Не применять для детей в возрасте до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены полости рта жидкие не замаркированы как противопоказанные для</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>детей (например, «только для взрослых»).</p> <p>(b) Содержит фтористое олово</p> <p>Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида.</p> <p>Должны быть указаны рекомендации по применению.</p> <p>Не предназначена для системного применения.</p> <p>Не рекомендуется потребление фтора из других источников.</p> <p>Не применять для лиц моложе 16 лет.</p> <p>Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.</p>
36	Гексадециламмоний фторид	Цетиламин гидрофторид	Средства гигиены полости	(a) 0,15 процента в пересчете на	(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрыхлителями в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	(a) Содержит гексадециламмоний

<p>(Hexadecyl ammonium fluoride)</p>	<p>(Cetylamine Hydrofluoride) CAS No3151-59-5, EC № 221-588-7</p>	<p>рта</p>	<p>молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.</p>	<p>фторид. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, «только для взрослых») следующая маркировка обязательна: «Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых». В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу". Для средств гигиены полости рта жидких: «Не применять для детей в возрасте</p>
--------------------------------------	---	------------	--	--

					<p>до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены полости рта жидкие не замаркированы как противопоказанные для детей (например, «только для взрослых»).</p>
				<p>(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.</p>	<p>(b) Содержит гексадециламмоний фторид. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению.</p>
					<p>Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из</p>

37	<p>3-(N-гексадецил-N-2-гидроксиэтиламмоний)пропилбис-(2-гидроксиэтил) аммония дифторид (3-(N-Hexadecyl-N-2-hydroxyethylammonio)propylbis (2-hydroxyethyl) ammonium difluoride</p>		Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		<p>других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.</p>
						<p>(а) Содержит 3-(N-гексадецил-N-2) гидроксипропиламмоний)пропилбис-(2-гидроксиэтил) аммония дифторид. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, «только для взрослых») следующая маркировка обязательна: «Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования</p>

						<p>глотания осуществлять чистку под контролем взрослых».</p> <p>В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ».</p> <p>Для средств гигиены полости рта жидких: «Не применять для детей в возрасте до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены полости рта жидкие не замаркированы как противопоказанные для детей (например, «только для взрослых»).</p>
				<p>(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в</p>		<p>(b) Содержит 3-(N-гексадецил-N-2) гидроксипиридин пропилбис(2-гидроксипиридин) аммония дифторид.</p> <p>Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5</p>

				<p>данном при- ложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.</p>	<p>процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида.  Должны быть указаны рекомендации по применению.  Не предназначена для системного применения.  Не рекомендуется потребление фтора из других источников.  Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.</p>
38	<p>N,N,N'-трис- (полиокси-этилен)-N- гексадецил- пропилендиамин дигид-рофторид (N,N,N'- Tris(polyoxyethylene)-N- hexadecyl- propylenediamine dihydrofluoride)</p>		Средства гигиены полости рта	<p>(а) 0,15 процента в пересчете на моляр-ную массу фтора. В смеси с другими фтор- содержащими соединениями, разрешенными в данном при- ложении, общая концентрация фтора не должна</p>	<p>(а) Содержит N,N,N'- трис-(полиоксиэтилен) -N-гексадецилпропи- лендиамин дигидро- фторид.  Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она</p>

				<p>превышать 0,15 процента.</p>		<p>не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна:</p> <p>«Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых».</p> <p>В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ».</p> <p>Для средств гигиены полости рта жидких: «Не применять для детей в возрасте до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены полости рта жидкие не замаркированы как противопоказанные для</p>
--	--	--	--	---------------------------------	--	--

39	9-октадецен-1-амин	Октадецениламмоний	Средства	(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном положении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.		детей (например, «только для взрослых»).
				(b) Содержит дигидрофторид N,N',N''-трис(полиоксэтилен)-N-гексадецилпропилендиамин. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.		(a) Содержит окта-

<p>гидрофторид (9-Octadecen-1-amine hydrofluoride)</p>	<p>фторид (Octadecenyl- ammonium fluoride) CAS № 36505-83-6</p>	<p>гигиены полости рта</p>	<p>в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор- содержащими соединениями, разрешенными в данном при- ложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.</p>	<p>децениламмоний фторид. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, «только для взрослых») следующая маркировка обязательна: «Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых». В случае потребления фтора из других источников, обрати- тесь к стоматологу или врачу " . Для средств гигиены полости рта жидких: «Не применять для</p>
--	---	--------------------------------	---	--

					<p>детей в возрасте до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены полости рта жидкие не замаркированы как противопоказанные для детей (например, «только для взрослых»).</p>
				<p>(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.</p>	<p>(b) Содержит октадециламмоний фторид. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц</p>

40	<p>Динатрий гексафторсиликат (Disodium hexafluorosilicate)</p>	<p>Фторсиликат натрия (Sodium fluorosilicate) CAS №16893-85-9, EC № 240-934-8</p>	<p>Средства гигиены полости рта</p>	<p>(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.</p>	<p>моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.</p>
				<p>(а) Содержит фтор-силикат натрия. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, «только для взрослых») следующая маркировка обязательна:</p> <p>«Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых».</p> <p>В случае потребления фтора из других источников, обратитесь</p>	

					к стоматологу или врачу". Для средств гигиены полости рта жидких: «Не применять для детей в возрасте до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены полости рта жидкие не замаркированы как противопоказанные для детей (например, «только для взрослых»).
					(b) Содержит фтор-содержащий натрий. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для
			(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрыхлителями в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5		

	<p>41</p> <p>Дикалия гексафторсиликат (Dipotassium hexafluorosilicate)</p>	<p>Фторсиликат калия (Potassium fluorosilicate) CAS № 16871-90-2, EC № 240-896-2</p>	<p>Средства гигиены полости рта</p>	<p>(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.</p>	<p>процента.</p>	<p>системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.</p>
				<p>(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.</p>		<p>(а) Содержит фтор-силикат калия Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, «только для взрослых») следующая маркировка обязательна: «Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять</p>

						<p>чистку под контролем взрослых».</p> <p>В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу.</p> <p>Для средств гигиены полости рта жидких: «Не применять для детей в возрасте до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены полости рта жидкие не замаркированы как противопоказанные для детей (например, «только для взрослых»).</p>
				<p>(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора.</p> <p>В смеси с другими фторсодержащими соединениями,</p>		<p>(b) Содержит фтор-силикат калия.</p> <p>Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида.</p>

				<p>разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.</p>		<p>Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.</p>
42	<p>Гексафторсиликат аммония (Ammonium hexafluorosilicate)</p>	<p>Фторсиликат аммония (Ammonium fluorosilicate) CAS № 16919-19-0, EC № 240-968-3</p>	<p>Средства гигиены полости рта</p>	<p>(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.</p>		<p>(а) Содержит фтор-силикат аммония. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, «только для взрослых») следующая маркировка обязательна: «Дети 6 лет и младше: количество используемой</p>

					<p>пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых».</p> <p>В случае потребления флора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу.</p> <p>Для средств гигиены полости рта жидких: «Не применять для детей в возрасте до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены полости рта жидкие не замаркированы как противопоказанные для детей (например, «только для взрослых»).</p> <p>(b) Содержит фтор-силикат аммония.</p> <p>Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на</p>
					<p>(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора.</p>

				<p>В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном положении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.</p>		<p>молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида.</p> <p>Должны быть указаны рекомендации по применению.</p> <p>Не предназначена для системного применения.</p> <p>Не рекомендуется потребление фтора из других источников.</p> <p>Не применять для лиц моложе 16 лет.</p> <p>Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.</p>
43	<p>Гексафторсиликат магния (Magnesium hexafluorosilicate)</p>	<p>Фторсиликат магния (Magnesium fluorosilicate) CAS No 16949-65-8, EC No 241-022-2</p>	<p>Средства гигиены полости рта</p>	<p>(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном положении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.</p>		<p>(а) Содержит фтор-силикат магния.</p> <p>Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, «только для взрослых»)</p>

						<p>следующая маркировка обязательна:</p> <p>«Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизации глотания осуществлять чистку под контролем взрослых».</p> <p>В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ».</p> <p>Для средств гигиены полости рта жидких: «Не применять для детей в возрасте до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены полости рта жидкие не замаркированы как противопоказанные для детей (например, «только для взрослых»).</p>
				(b) В концент-		(b) Содержит фтор-

				<p>рации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора.</p> <p>В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента в пересчете.</p>		<p>силикат магния.</p> <p>Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида.</p> <p>Должны быть указаны рекомендации по применению.</p> <p>Не предназначена для системного применения.</p> <p>Не рекомендуется потребление фтора из других источников.</p> <p>Не применять для лиц моложе 16 лет.</p> <p>Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.</p>
47	<p>3-пиридинметанол гидрофторид (3-Pyridinemethanol hydrofluoride)</p>	<p>Гидрофторид никометанола (Nicomethanol hydrofluoride) CAS No 62756-44-9</p>	<p>Средства гигиены полости рта</p>	<p>(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в</p>		<p>(а) Содержит гидрофторид никометанола</p> <p>Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную</p>

				<p>данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.</p>		<p>массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, «только для взрослых») следующая маркировка обязательна:</p> <p>«Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых».</p> <p>В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу.</p> <p>Для средств гигиены полости рта жидких: «Не применять для детей в возрасте до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены полости рта жидкие не замаркированы как</p>
--	--	--	--	---	--	--

					<p>противопоказанные для детей (например, «только для взрослых»).</p>
			<p>(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном положении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора</p>		<p>(b) Содержит гидроксид никометанола. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.</p>

56	Фтористый магний (Magnesium fluoride)	Фтористый магний (Magnesium Fluoride) CAS No 7783-40-6, ЕС № 231-995-1	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор- соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	(а) Содержит фтористый магний. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, «только для взрослых») следующая маркировка обязательна: «Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых». В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу. Для средств гигиены полости рта жидких: «Не применять для
----	--	---	------------------------------------	---	---

						<p>детей в возрасте до 6 лет, если нет рекомендаций стоматолога или педиатра», если средства гигиены полости рта жидкие не замаркированы как противопоказанные для детей (например, «только для взрослых»).</p>
				<p>(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсоединениями, разрешенными в данном положении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.</p>		<p>(b) Содержит фтористый магний. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц</p>

							моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
--	--	--	--	--	--	--	---

»

б) дополнить позициями 323-324 следующего содержания:

323	Метил-N-метилантранилат (Methyl-N-methylantranilate)	(CAS № 85-91-6, EN № 201-642-6)	(а) Несмываемая продукция	(а) 0,1 про- цента	Для (а): Не использовать в солнцезащитной продукции и предназначенной для использования в условиях длительного воздействия естественного или искусственного УФ-излучения.	
			(б) Смываемая продукция	(б) 0,2 процен-та	Для (а) и (б): - Не использовать с нитрозирующими агентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах без нитригов	

«

324	Метил гидроксибензоат (Methyl hydroxybenzoate)	2- 2- Метил салицилат (Methyl Salicylate) (CAS 119-36-8, EN 204-317-7)	(a) Несмываемая продукция для кожи (кроме продукции для макияжа лица, спреев/аэрозолей, лосьонов для тела спреев/аэрозолей-дезодорантов и ароматизаторов на водно-спиртовой основе) и несмываемой продукции для волос (за исключением спреев/аэрозолей)	(a) 0,06 процента	Не использовать в препаратах для детей младше 6 лет, за исключением (k) «Зубная паста»	
			(b) Макияж лица (кроме продуктов для губ, макияжа глаз и средств для снятия макияжа)	(b) 0,05 процента		
			(c) Макияж глаз и средство для снятия макияжа	(c) 0,002 процента		
			(d) Несмываемая продукция для волос (спрей/аэрозоль)	(d) 0,009 процента		

(e) Дезодорант спрей/аэрозоль	(e) 0,003 про-цента		
(f) Лосьон для тела спрей/аэрозоль	(f) 0,04 про-цента		
(g) Смываемая продукция для кожи (кроме средств для мытья рук) и смываемая продукция для волос	(g) 0,06 про-цента		
(h) Мытье рук	(h) 0,6 про-цента		
(i) Парфюмерная продукция на водно-спиртовой основе	(i) 0,6 про-цента		
(j) Продукция для губ	(j) 0,03 про-цента		
(k) Зубная паста	(k) 2,52 про-цента		
(l) Жидкость для полоскания рта предназначенная для детей в возрасте 6–10 лет.	(l) 0,1 про-цента		

			(m) Жидкость для полоскания рта предназначена для детей старше 10 лет и взрослых	(m) 0,6 процента		
			(n) Спрей для рта	(n) 0,65 процента		»

3. В приложении 4 к указанному техническому регламенту:

а) Позицию 51 изложить в новой редакции:

«	51	Натрий N- (гидрокси- метил)глицинат (Sodium N-(hydroxymethyl) glycinate)	гидоксиметилглицинат натрия Sodium Hydroxymethylglycinate	70161-44-3 274-357-8		0,5 процента	Не использовать, если не будет доказано, что максимальная теоретическая концентрация высвобождаемого формальдегида, независимо от источника, в составе, поступающем на рынок, составляет менее 0,1 процента.	»
---	----	--	---	----------------------	--	--------------	--	---

в) Примечание 2 изложить в новой редакции:

«Примечание: 2. Вся готовая парфюмерно-косметическая продукция, содержащая вещества, перечисленные в настоящем приложении, выделяющие формальдегид, должна иметь маркировку с предупреждением «выделяет формальдегид», если общая концентрация формальдегида, выделяемого из готовой продукции, превышает 0,001 % (10 частей на миллион), независимо от того, содержит ли готовая продукция одно или несколько веществ, выделяющих формальдегид.»

4. В приложении 5 к указанному техническому регламенту:

а) Позиции 4, 10 изложить в новой редакции:

4	2-гидрокси-4-метоксибензофенон/Оксибензон (2-hydroxy-4-methoxybenzophenone/Oxybenzone)	бензофенон-3 Benzophenone-3	131-57-7	205-031-5	<p>а) Продукция для лица, для рук и для губ, за исключением продукции с пропеллентом и помпового спрея.</p> <p>б) Продукция для тела, в том числе с пропеллентом и помповый спрей</p>	<p>а) 6 процентов</p> <p>б) 2,2 процента</p>	<p>Для а) и б) не более 0,5 % для защиты состава продукции</p> <p>а) При использовании в концентрации 0,5 % для защиты состава продукции количество, используемое в качестве УФ-фильтра, не должно превышать 5,5 %.</p> <p>б) При использовании в концентрации 0,5 % для защиты состава продукции</p>	Для а) и б): Содержит бензофенон-3(1)
---	--	--------------------------------	----------	-----------	---	--	---	---------------------------------------

									количество, используемое в качестве УФ-фильтра, не должно превышать 1,7 %.	
								с) Другая продукция	с) 0,5 процента	

»

10	2-Диано-3,3-дифенил-акриловой кислоты, 2-этилгексилловый эфир/ Октокрилен (2-Cyano-3,3-diphenyl acrylic acid, 2-ethylhexyl ester /Octocrilene) <sup>(6)</sup>	октокрилен Octocrilene	6197-30-4	228-250-8	а) Пропеллентные спреи б) Другая продукция	а) 9 процентов б) 10 процентов		
----	---	---------------------------	-----------	-----------	---	-----------------------------------	--	--

«

»

(6) Бензофенон как примесь и/или продукт разложения октокрилена должен содержаться в следовых количествах.